

Aus der konservierenden Abteilung des zahnärztlichen Instituts der  
Ludwig-Maximilians-Universität München.  
(Vorstand: Professor Dr. Kranz.)

---

# »Vererbung und klinische Bedeutung der Zahnüberzahl.«

Mit einem kasuistischen Beitrag.

---

## Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde  
verfaßt und einer hohen medizinischen Fakultät  
der Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Ludwig Botsch,  
appr. Zahnarzt.

München 1928

---

Druck von Michael Laßleben in Kallmünz bei Regensburg.



Aus der konservierenden Abteilung des zahnärztlichen Instituts der  
Ludwig=Maximilians=Universität München.  
(Vorstand: Professor Dr. Kranz.)

---

# »Vererbung und klinische Bedeutung der Zahnüberzahl.«

Mit einem kasuistischen Beitrag.

## Inaugural=Differtation

zur Erlangung der Doktorwürde in der Zahnheilkunde  
verfaßt und einer hohen medizinischen Fakultät  
der Bayer. Ludwig=Maximilians=Universität zu München

vorgelegt von

Ludwig Botsch,  
appr. Zahnarzt.

München 1928

---

Druck von Michael Laßleben in Kallmünz bei Regensburg.

Gedruckt mit Genehmigung der  
med. Fakultät der Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München.

Referent: Professor Dr. Kranz



Entsprechend dem zahnärztlich-klinischen Streben nach Erhaltung und Wiederherstellung der Zähne und der Funktion des Gebisses hat sich der Praktiker als Maßstab seines Denkens und Handelns den Begriff der Norm gebildet, der, vom Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit ausgehend, bestimmte Bedingungen an Bau und Zusammensetzung des Organs und der Organteile stellt. Alles, was von der Regel abweicht und die Zweckmäßigkeit des Gebisses stört, bezeichnet er als Anomalie. Es ist verständlich, wenn von diesem rein teleologischen Gesichtspunkt aus die Anomalie als Fehler angesehen und dementsprechend für ihre Entstehung äußere, während der Ontogenese einwirkende Faktoren verantwortlich gemacht werden. Gewiß müssen wir diese Möglichkeit in Rechnung ziehen und es wäre falsch, auf der Suche nach der Ursache einer Anomalie an den Ergebnissen der entwicklungsgeschichtlichen Forschungen vorüberzugehen, umso mehr, als wir von ihr reale Grundlagen erwarten dürfen.

Vom Standpunkt der wissenschaftlichen Forschung aus ist der vom Praktiker gebildete Normbegriff nicht haltbar. Wenn der menschliche Organismus das Produkt einer Jahrmillionen dauernden Stammesentwicklung ist, einer Entwicklung, die Altes in langsam fortschreitender Umbildung neuauftretenden Anforderungen anpaßt, dann darf eine beliebige Entwicklungsstufe nie für sich allein, sondern nur in ihrem Zusammenhang mit dem Vorher und Nachher betrachtet werden. Wir erkennen dann, daß Anomalien den Normalien durchaus gleichwertige Bildungen sind, daß sie einmal Nachklänge einer früheren Entwicklungsstufe, einandermal die ersten Anfänge einer kommenden Phase darstellen. Bei dieser Entwicklung sind Faktoren am Werke, die sich unserer Beobachtung entziehen: dort die starke, konservative Macht der Vererbung, hier die auf Fortschritt gerichtete Variabilität des Organismus. So zeigt uns die Stammesgeschichte und die Vererbungslehre neue Wege zur Klärung der Ätiologie der »Anomalien«.

Eine nicht eben selten auftretende und in der zahnärztlichen Literatur viel beachtete Anomalie ist die Zahnüberzahl. Da sie in vielen Fällen unangenehme klinische Folgen zeitigt, wurde von jeher auf die Erkenntnis ihrer Ätiologie viel Mühe verwandt. Den Forschungen, die sich auf die menschliche Ontogenese stützen, stellen sich naturgemäß ernste Schwierigkeiten entgegen, schon deshalb, weil bei dem geringen Prozentsatz der Fälle nur der Zufall dem Forscher das Material an die Hand geben kann, weil weiter der Zeitraum, innerhalb dessen sich das Werden eines überzähligen Zahnes abspielt, relativ groß, ja wie sich zeigen wird, unbegrenzt groß sein kann.

Die meisten Autoren stehen auf dem Standpunkt, daß der Zahnleiste eine natürliche Befähigung zur Ausbildung unbegrenzt zahlreicher Keime innewohnt. Kollmann (24) hat auf Grund exakter Untersuchungen festgestellt, daß die Zahnleiste des Menschen außer den Anlagen für die Milch- und Ersatzzähne zahlreiche überzählige Keime produziert, deren weitere Entwicklung zwar normalerweise unterdrückt wird, die aber doch in Ausnahmefällen in der Form von überzähligen Zähnen oder Zahngebilden zur Entwicklung gelangen. Stettenheimer (43) stellt sich auf den gleichen Standpunkt, er versucht zugleich eine Erklärung dieser Überproduktion, wenn er sagt, daß ebenso wie jeder Organismus weit mehr Abkömmlinge erzeugt als zur Entwicklung gelangen können, auch während der Ontogenese, weit mehr Zahnkeime angelegt werden als zur Ausbildung gelangen sollen. Neben Urbantschitsch (46) will auch Greve (17) und Adloff (1) die Entstehung von überzähligen Zähnen, besonders von Zapfenzähnen, auf zufällige Ausläufer der Zahnleiste zurückgeführt wissen. Stehr (43) hält die Zahnleiste besonders dann zur Überfunktion disponiert, wenn sie gezwungen ist, scharfe Bogen und Ecken zu machen, und so in eine abnorme Lage gerät. Dependorf (12) geht von einem ähnlichen Gesichtspunkt aus. Nach seiner Ansicht zeigt die Zahnleiste ihre Fähigkeit zur Überproduktion vor allem bei Vergrößerung ihrer Oberfläche, wie sie z. B. bei Entwicklungsstörungen des Zwischenkiefers in Faltenbildung, oder bei Nichtverwachsung der beiden Oberkieferfortsätze (Kiefer- und Gaumenspalten) in Verlängerung des freien Randes zum Ausdruck kommt. Entsprechend der vergrößerten Oberfläche gibt die Zahnleiste neuen, überzähligen Keimen das Leben.

Während nach dieser Ansicht Dependorf's Wachstumsstörungen im Bereich der Kiefer nur sekundär das Entstehen von überzähligen Keimen veranlassen, sehen andere Autoren in ihnen die primäre Ursache der Überzahl. So glaubt Busch (8), daß alle atypisch geformten überzähligen Zähne aus mechanisch abgesprengten Zellen der Zahnleiste hervorgegangen sind. Wegen der Häufigkeit des Auftretens der Emboli nahe der Mittellinie des Oberkiefers schließt Busch auf eine fissurale Bildungsabweichung, die er in Parallele stellt zu den fissuralen Angiomen, welche Virchow als angeborene Gefäßgeschwülste in der medianen Vereinigungslinie des Körpers festgestellt hat. Auch Partsch (30) sieht die atypischen überzähligen Zähne als aus mechanisch abgespaltenen Teilen der Zahnleiste entstanden an. Besonders scheint ihm die Tatsache dafür zu sprechen, daß weitaus die Mehrzahl der Fälle im Bereich des Zwischenkiefers zur Beobachtung kommt, wo die embryonale Entwicklung solche Abspaltungen begünstigt. Aus eben diesem Grunde finde man auch bei Spaltbildungen gar nicht selten Emboli. Dieselbe Auffassung hat auch Berten, wie aus einer Arbeit Erdmann's (13) hervorgeht. Berten sieht die primäre Entstehungsursache der überzähligen

Zähne ebenfalls in durch Raummangel bedingter Quetschung und Faltung der Zahnleiste und weist zur Begründung auf das häufige Vorkommen der Überzahl in schlecht entwickelten, zu engen Kiefern, auf ihre Vergefellung mit Kieferspalten und auf ihr äußerst seltenes Auftreten im Milchgebiß, wo Raummangel nicht besteht, hin.

Wenn aus wahllos abgesprengten Teilen der Zahnleiste ein überzähliges Zahngelilde entstehen kann, so muß wohl auch jeder Rest der Zahnleiste, der sich der Resorption entzogen hat, die Entwicklungsfähigkeit zu einem Zahnkeim in sich tragen. Stettenheimer (44) bestätigt dies, wenn er sagt, daß die Zahnleiste zeitlebens mit embryonaler Kraft ausgerüstet ist und ihre Kraft erst mit Eintritt der allgemeinen Senilität erlischt. Dependorf (12) entwirft uns auf Grund seiner entwicklungsgeschichtlich=embryonalen Studien an Säugetieren ein anschauliches Bild von der Keimfähigkeit und Lebensenergie der Zahnleiste und ihrer Zellen: »Wir sehen die Zahnleiste bis zur letzten Zelle standhalten, wir sehen immer und immer wieder ihr Bemühen, ihre Selbständigkeit zu bewahren und neue Keime zu schaffen. Doch die in Funktion befindlichen Zahnanlagen unterdrücken die aufstrebenden Geldwieser, und nur bisweilen entsteht aus dem rudimentären Keim ein überzähliger Zahn.« Öhrlein (28) sagt hierüber folgendes: »Nach Ausbildung des Schmelzorganes ist die Funktion der Zahnleiste erfüllt, sie wird allmählich resorbiert. Vereinzelte Reste bleiben noch postembryonal erhalten als Senes'sche Keime. Aus irgendeinem Grunde einen plötzlichen Wachstumsantrieb erhaltend, können sie sich unter anderem zu überzähligen Zähnen entwickeln.« Auch Stehr (43) hält Überbleibsel der Zahnleiste für die Ursache der Zahnüberzahl und Röse<sup>1)</sup> gibt der gleichen Ansicht mit den Worten Ausdruck: »Jeder Rest der Zahnleiste, soweit er nicht zu einer Cyste, Epithelperle u. s. w. entartet ist, kann Veranlassung zur Bildung eines überzähligen Zahnes oder unvollständigen Zahngelildes geben.«

Von allen bisher besprochenen Theorien wurde die Zahnleiste oder ein Teil von ihr als Schöpfer des überzähligen Zahnes angesprochen. Untersuchungen über Schmelztropfen, die besonders am Zahnhals und an den Wurzeln der Molaren gefunden werden, haben den Gedanken nahegelegt, überzählige Zahngelilde in gewissen Fällen als Spaltprodukte eines normalen Zahnkeims zu betrachten. Auch hiebei spielen Faltungen eine Rolle. Baume sagt darüber folgendes (5): »Ich besitze in meiner Sammlung fast die ganze Entwicklungsreihe mit allen Übergängen vom kleinen, kaum sichtbaren Schmelztröpfchen bis zum selbständigen überzähligen Mahlzahn. Ich betrachte diese Schmelztröpfchen als Divertikel des Schmelzes, gewissermaßen als eine Ausstülpung: diese Abspaltung kann evident bis zur Ausbildung eines selbständigen Zahnes führen. Die Schmelztropfen beweisen mir,

<sup>1)</sup> zitiert nach Greve (17).

daß ein überzähliger Zahn durch Abspaltung von einem normalen Nachbarn entstehen kann.« Auch Walkhoff (48) kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß es ähnlich wie zur Entstehung von Schmelztropfen auch zur Bildung von überzähligen Zapfenzähnen kommen könne, nur nimmt er im Gegensatz zu Baume an, daß das Spaltprodukt dentinogenen Ursprungs sei. Ebenso wie Urbantschitsch (46) nimmt auch Adloff (1) an, daß gelegentlich auch auftretende Teilungen eines Keimes oder Abspaltungen von einem Keim als Ursache der Überzahl angenommen werden müssen. Wenn Peckert (31) betont, daß die abgesprengten Stücke eines Schmelzkeimes mit der Fähigkeit der selbständigen Weiterentwicklung begabt seien, so setzt er sich damit in Widerspruch zu Dependorf (12), der die Teile eines Keimes für nicht mehr bildungsfähig hält. Bolk (7) schließlich nimmt speziell für die typischen überzähligen Zähne im Bereich des Zwischenkiefers Abspaltung von einem normalen Schneidezahnkeim, an, außerdem hält er es für möglich, daß in der übermäßigen Ausbildung des Tuberculum der Incisivi eine Andeutung der Zahnkeimpaltung liege. Dieser Annahme widerspricht aber Riha (36) durch die Feststellung, daß sich in den zapfenartig gebildeten Tubercula keine Pulpa vorfinde und damit ihre Weiterentwicklung als selbständiges Zahngewebe unmöglich sei.

Zum Abschluß sei der Vollständigkeit halber noch die neuerdings von Herbst (18) aufgestellte Hypothese angeführt, die weder die Zahnleiste, noch den Zahnkeim als Urheber der überzähligen Zahnkeime betrachtet, sondern ihre Entstehung in die früheste embryonale Phase, in der Mißbildungen möglich werden (Herxheimer), in das Blastulastadium verlegt. Herbst zweifelt eine Abhängigkeit der überzähligen Embryonkeime von der Zahnleiste an, weil Zapfenzähne »auch allein in einem von Natur zahnlosen Zwischenkiefer oder gar Oberkiefer vorkommen können, aber auch der Umstand, daß sie keine normale Zahnform aufweisen und vor allen Dingen niemals dem Zahnwechsel unterworfen sind, vor allem aber die Tatsache, daß solche Zahnmißbildungen auch in Ovarialcysten vorkommen, zwingt uns sie von einem ganz anderen Gesichtspunkt aus zu betrachten.« Herbst kommt schließlich zu dem Ergebnis, alle in der Kiefermittellinie auftretenden überzähligen Zahngewebe seien nichts anderes als Teratome, d. h. aus dislozierten Blastomeren entstandene Mißgewächse.

Sehen wir von dieser Herbst'schen Hypothese, die in der Literatur keine Beachtung gefunden hat, ab, so kommen wir zu dem Ergebnis, daß alle aufgeführten Theorien lediglich die Möglichkeit zur Bildung überzähliger Zähne erklären, eine Möglichkeit, die wohl nie in Zweifel gezogen worden ist. Auf dem Wege zur Erkenntnis der Ätiologie bringen sie uns aber keinen Schritt weiter. Kollmann (24) begnügt sich mit seiner Feststellung, daß die Zahnleiste in der Regel überzählige Keime produziert, auf die

möglichen Ursachen dieses Gelfehens geht er nicht ein. Stettenheimer (44) glaubt in diesem Zusammenhang, daß ebenso wie jeder Organismus weit mehr Abkömmlinge erzeugt als zur Reife gelangen können, auch während der Ontogenese weit mehr Zahnkeime angelegt werden als zur Ausbildung gelangen sollen. Das tertium comparationis, das bei diesem Vergleich wohl in der Schaffung einer Produktionsreserve liegen soll, ist aber auf das diphyodonte Gebiß des Menschen nicht anwendbar. Denn wir haben keine Anhaltspunkte für die Annahme, daß ein überzähliger Zahnkeim die Stelle eines etwa zu Grunde gegangenen normalen Keimes einnehmen kann. Wenn andere Autoren von zufälligen Ausläufern der Zahnleiste sprechen, so gehen sie damit der Erklärung der Ätiologie geradezu geflissentlich aus dem Wege. Auch die übrigen Erklärungen, welche die Überproduktion auf mechanische Einwirkungen zurückführen, können nicht befriedigen, denn die Frage nach der Isolierung des Keimes von der Schmelzleiste oder von einem anderen, normalen Keim ist von untergeordneter Bedeutung und steht mit der Ätiologie in keinem Zusammenhang. Die Art und Weise der Isolierung kann wohl durch Absprennung, also durch aktiv wirkende Kräfte, geschehen, ebenso aber ist sie auf einen passiven Vorgang, nämlich auf die Resorption der übrigen Teile der Zahnleiste zurückzuführen. Die Vorbedingung für das Entstehen eines überzähligen Zahnes ist aber immer, daß die abgepressten oder übrigbleibenden Zahnleistenteile zur Bildung eines Zahnes differenzierte Zellen sind. Unter dieser Voraussetzung bleiben nach Peckert (31) nur noch folgende Fragen zu klären: »Welche Faktoren werden aktiv um aus der zugestandenen Möglichkeit einer Mehrbildung von Zähnen bis zur reellen Erzeugung dieser Gebilde zu führen? Oder welche Faktoren kommen dabei in Wegfall, die unter normalen Verhältnissen die Unterdrückung und Vernichtung der überschüssigen Zahnanlagen besorgen?« Das sind aber Fragen, die mit der Ätiologie der überzähligen Zähne nichts zu tun haben und deshalb aus dem Rahmen unserer Betrachtung fallen.

Wir sehen, daß die Ätiologie der überzähligen Zähne mit den Ergebnissen der Entwicklungsgeschichte nicht befriedigend zu klären ist. In der gleichen Erkenntnis legt eine Reihe von Autoren ihrer Auffassung vom Wesen der überzähligen Zähne die Resultate der stammesgeschichtlichen Forschung zu Grunde, wonach das menschliche Gebiß als das reduzierte Entwicklungsprodukt einer ursprünglich reicheren Bezahnung anzusehen ist. Als Vergleichsgrundlage wird das Gebiß der nächsten stammesgeschichtlichen Vorfahren des Menschen, der Säugetiere benützt und zwar meist die generalisierte Formel für die höherstehenden Säugetiere, die Monodelphier: J 123 CI P 1234 M 123. Manchmal wird auch wohl noch weiter zurückgegriffen auf die Ausgangsformel für Säugetiere J 12345 CI P 1234 M 12345. Dem menschlichen Gebiß fehlen demnach gegenüber dem Monodelphier-Gebiß

in jeder Kieferseite ein Schneidezahn und zwei Prämolaren, gegenüber der Säugetierstammformel jederseits drei Schneidezähne, zwei Prämolaren und zwei Molaren. Treten nun im rezenten Gebiß überzählige Zähne auf, dann geschehe dies, so sagen die Anhänger dieser Hypothese, nicht etwa zufällig, die Schmelzleiste bringe diese Keime vielmehr in Rückerinnerung an eine bei unseren Säugetiervorfahren geübte Tätigkeit hervor, wir hätten es also mit dem Wiedererscheinen einer Stammeseigentümlichkeit nach vielen Generationen, mit Atavismus zu tun. Eine Reihe von Autoren wie Bruns-  
mann (11), Partsch (30), Baume (5) Busch (8), v. Metnitz (27), Re-  
spinger (34), Bolk (7), Adloff (2), Rosenberg (38), und Riesenfeld (35) machen die atavistische Deutung überzähliger Zähne von Bedingungen hinsichtlich ihrer Form und des Ortes ihres Auftretens abhängig. Ihnen gegenüber stehen die bedingslosen Anhänger dieser Hypothese. Nach Ansicht der letzteren ist es für die Deutung im atavistischen Sinne gleichgültig, ob der überzählige Zahn normale Gestalt besitzt oder ob er atypisch geformt ist. Denn lähe man das menschliche Gebiß als das Reduktionsprodukt einer ehemals reicheren Bezahnung an, so dürfe man nicht überrascht sein, wenn die Zähne, die ja nicht plötzlich, sondern im Laufe langer Entwicklungs-  
epochen eliminiert wurden, auch in reduzierter Form auftreten. Wallisch (47) weist in diesem Zusammenhang auf die seitlichen Incilivi und die dritten Molaren des recenten Gebisses hin, die vor unseren Augen alle Stadien des Rudimentärwerdens bis zum völligen Ausbleiben durchmachen. Auch das Auftreten von Überzähnen an ungewohnten Kieferstellen spreche nicht gegen die Hypothese, da sie ja leicht durch besondere Verhältnisse in eine falsche Durchbruchrichtung gedrängt werden könnten. Eine ausschlaggebende Rolle spiele lediglich die Zahl und diese werde nie überschritten.

Dieser Behauptung Wallisch's wird durch den einwandfrei gelungenen Nachweis von überzähligen Eckzähnen widersprochen, weiter durch das stark massierte Auftreten überzähliger Zähne. Als besonders krasses Beispiel dafür erwähnt Walkhoff (49) einen Fall, wo er zwei Brüdern im ganzen über 200 rudimentäre Zähndchen entfernen mußte. Greve (17) betont die Schwäche der atavistischen Hypothese, wenn er die Rückführung des Säugetiergebisses auf die Formel 3143 als recht problematisch bezeichnet.

In der Tat scheint in dieser Formel der wunde Punkt der atavistischen Hypothese zu liegen. An sich mag die Bestimmung eines Säugetierstammtypus oder eines Mittelwertes für das Säugetiergebiß vom paläontologischen und vergleichend anatomischen Gesichtspunkt aus durchaus korrekt sein. Wenn man aber Atavismus, das plötzliche Wiedererscheinen eines vor langen Generationen normalen Merkmals, überhaupt für möglich hält, dann ist man nicht berechtigt irgendwo in der Descendenzreihe eine willkürliche Grenze zu ziehen, jenseits der ein Suchen nach atavistischen Vergleichscharakteren

verboten ist. Denn Atavismus ist Vererbung, ist eine der stärksten Ausdrucksformen dieser Macht.

Auf Grund morphobiologischer Untersuchungen kommt Weismann (52) zu dem Ergebnis, daß die sterblichen Soma- oder Gewebszellen zum Aufbau der Körperorgane benutzt werden und nach Ableistung ihrer animalen und vegetativen Lebensfunktionen mit der Auflösung des Körpers zu Grunde gehen. Diesen Somazellen stehen die gewissermaßen unsterblichen Keim- oder Fortpflanzungszellen gegenüber, die bei Auflösung des Organismus weiterbestehen und neue Organismen zu bilden imstande sind. Die Funktionen der Vermehrung und der Erhaltung der Art sind an die Keimzellen gebunden, die den rein vegetativen, für die Quantität maßgebenden Somazellen die Qualität übermitteln. Weismann kommt damit zu dem Schluß, daß das Keimplasma überhaupt nicht durch das Soma des Individuums bedingt und beeinflusst ist, sondern seine Entstehung direkt auf den Ausgangspunkt des Individuums, auf die elterlichen Keimzellen zurückzuführen ist. Man kann demnach das Keimplasma mit einer lang dahinkriechenden Wurzel vergleichen, von der sich von Strecke zu Strecke einzelne Pflänzchen, d. h. die Individuen der aufeinanderfolgenden Generationen erheben. Die das Soma beeinflussenden Qualitäten des Keimplasmas brauchen aber nicht in jeder Erbfolge in Erscheinung zu treten, sie können Generationen lang latent bleiben, um dann plötzlich wieder zum Vorschein zu kommen.

Die ganze Lehre von der Descendenz wäre aber unhaltbar, wenn dem Keimplasma die Wandlungsfähigkeit abgesprochen würde. Die Ansicht Lamarck's, daß durch Änderung der Lebensweise und der Funktion neue vererbare Artmerkmale hervorgerufen würden, wird stark bekämpft, da sie die unbewiesene Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften zur Voraussetzung hat. Weismann (53) sieht in dem Befruchtungsprozeß, d. h. in der Vermischung zweier individuell verschiedener Vererbungstendenzen — Amphimixis — die Hauptquelle der Variationen. In der zweielterlichen Fortpflanzung findet zu Beginn jeder Generation eine Neukombination der Keimplasmen statt. Die Amphimixis liefert somit das Material für die individuellen Unterschiede und die Natur hat dann als Züchterin die Aufgabe durch Selektion neue Arten hervorzubringen.

Diese Lehren von der Kontinuität des Keimplasmas und der Amphimixis werden durch die Mendel'schen Bastardierungsversuche bestätigt. Mendel fand (zitiert nach Haecker [21]), daß die antagononistischen Merkmale zweier Stammformen auf die Nachkommen vererbt werden. Äußerlich tritt diese Vererbung auf dreierlei verschiedene Art in Erscheinung: einmal ist das Resultat eine Zwischenform zwischen den beiden Stammrassen, einandermal tritt das eine elterliche Merkmal dominant auf während ein anderes

Merkmal des zweiten Elternteiles recessiv bleibt um erst in den späteren Generationen wieder in äußere Erscheinung zu treten; und schließlich können die Bastarde neue, bei keinem der Eltern sichtbare Eigentümlichkeiten aufweisen: sie zeigen atavistischen Charakter.

Nehmen wir somit die Lehre von der Kontinuität des Keimplasmas als richtig an, dann sind wir wohl auch berechtigt den Vergleichstypus für überzählige Zähne, besonders für die Zapfenzähne in den zahnreicheren, homodonten Gebissen niederer Tierklassen zu suchen.

Nach de Terra (45) läßt sich die Überproduktivität der Zahnleiste, wie sie Kollmann festgestellt hat, mit großer Wahrscheinlichkeit auf das polyphyodonte Verhalten der Reptilien zurückführen. Mayer (26) hält die labial stehenden überzähligen Zähne für Reste eines über die ganze Mundhöhle verteilten Gebisses niederer Wirbeltiere, auch bei anderen Fällen von Überzahl denkt er an Rückschlag der Säuger auf die niedrigeren Vorfahren. Diesen Gedanken legen auch die folgenden Beobachtungen nahe. Berten (6) entfernte einmal einem Patienten 8 kleine retinierte Zähnchen, die teils miteinander verschmolzen, teils durch Knochen voneinander getrennt waren. Walkhoff (49) stellte auf der Erlanger Zahnärzterversammlung 1896 zwei Brüder vor, denen im ganzen ungefähr 200 rudimentäre Zähne entfernt werden mußten. Über einen ähnlichen Fall berichtet Schmitz (40), der bei zwei Brüdern zahlreiche überzählige Zahngebilde, die innerhalb weniger Jahre nacheinander an Stelle der Molaren durchbrachen, beobachtete. Wenn A. Witzel diesen Fall damals als Stütze der Konkreszenzhypothese ansah, so gab er damit implicite die Möglichkeit des Rückschlags auf das polyphyodonte, haplodonte Gebiß niederer Säugetiervorfahren zu. In diesem Zusammenhang ist die von Orth (29) ausgesprochene Ansicht von Interesse, die für eine Reihe von tierähnlichen Bildungen ontogenetischen Atavismus annimmt. Orth sagt, wenn die Ontogenie die Wiederholung der Phylogenie ist, dann können »durch Hemmungsbildungen während der Ontogenie tierähnliche Anomalien entstehen.« Es fragt sich aber, ob diese Hemmungen exogener Natur sind, oder ob sie nicht schon im Keimplasma, etwa in einer entsprechend ungenügenden Amphimixis begründet liegen. Man ist eher geneigt, letzteres anzunehmen, denn die Rekapitulation der Phylogenie wird offenbar durch die Variabilität des Keimplasmas gefördert.

Die oben angeführten Fälle massenhaft auftretender überzähliger Zähne geben uns zusammen mit den Ergebnissen der modernen Erblichkeitsforschung wohl die Berechtigung die Atavismushypothese auf eine breitere Basis zu stellen.

Im Gegensatz zur atavistischen Anschauung, nach welcher die Hyperdentition Rückschritt bedeutet, werden von manchen Autoren die überzähligen Zähne auf eine phylogenetisch fortschrittliche Entwicklung

zurückgeführt. Dieser Annahme widerspricht aber die allgemein in der Literatur vertretene Auffassung, daß die Stammesgeschichtliche Weiterentwicklung die bisher verfolgte Tendenz der Dezimierung des Gebisses weiterhin einhält.

Wenn Atavismus als ursächliches Moment für die Zahnüberzahl in Betracht kommt, dann müssen, da nur erbliche Vorfahrencharaktere zu Atavismen führen, überzählige Zähne selbst weiter vererbt werden können. Ob dies tatsächlich zutrifft, dafür vermag uns auch die Vererbungsforchung keinen zwingenden Beweis zu liefern. Sie kann nur die Häufigkeit der Hyperdentition innerhalb bestimmter Gruppen verwandter Individuen feststellen und statistisch auswerten, um daraus die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Vererbung abzuleiten. Als solche Gruppen kommen außer der Rasse die Familie und in dieser besonders (Siemens [42]) die eineiigen Zwillinge in Betracht. Es ist aber nötig, daß künftig alle beobachteten Fälle familiär auftretender Zahnüberzahl veröffentlicht werden. Bisher wurde dies verläumt. Die diesbezüglichen in der Literatur angeführten Fälle sind meist unter dem Gesichtspunkt einer anders gearteten, besonders interessanten Eigenart, nicht unter dem des erblichen Auftretens ausgewählt, daher auch die geringe Ausbeute, die uns die Literatur liefert.

Wallisch (47) stützt seine atavistische Auffassung von der Zahnüberzahl auf vier Thesen, deren eine lautet: »Überzählige Zähne treten häufig in Familien durch Generationen hindurch auf«, er kann aber selbst nur einen diesbezüglichen Fall aus der Literatur aufführen. Praeger (33) berichtet über zwei Geschwister, ein 8jähriges Mädchen und einen 11jährigen Knaben denen er je einen palatinal der 1J1 durchgebrochenen Zapfenzahn extrahierte. In diesen Zusammenhang gehören auch die von Walkhoff (49) und Schmitz (40) demonstrierten, weiter oben erwähnten Fälle von massierter Hyperdentition bei Brüdern. Fox (15) berichtet von einem Fall, wo Vater und Sohn die Anomalie der Überzahl aufwiesen. Michelson<sup>1)</sup> fand in einer 21gliedrigen, mit Hypertrichose behafteten Familie zwei Fälle mit je einem überzähligen Schneidezahn. Warnekros (50), der die Kieferspalten auf die erbliche Anlage überzähliger Zähne zurückführt — wir werden darauf weiter unten in anderem Zusammenhang zu sprechen kommen —, beobachtete an zwei Brüdern je einen überzähligen Incisivus. Diesen in der Literatur berichteten Fällen schließt sich der später zu beschreibende Fall, wo Mutter und Tochter Hyperdentition aufweisen, an.

Eineiige Zwillinge sind nach Siemens (42) und Praeger (33) besonders geeignete Objekte für die Vererbungsforchung, weil auf beide Zwillinge die Erbmasse gleich verteilt ist. Deshalb müssen alle Unterschiede, die eineiige Zwillinge aufweisen umweltbedingter Natur sein. Da aber auch hier

<sup>1)</sup> Virchow Archiv. Bd. 100.

Abweichungen durch zufällig ungleiche Teilung der Erbanlagen und durch nachträgliche Änderung derselben möglich sind, geben selbst die Untersuchung eineiiger Zwillinge keine eindeutigen Ergebnisse. Auch hier kann nur auf dem Wege der Statistik aus dem Überwiegen der positiven oder negativen Befunde auf Erbllichkeit oder Nicht-Erbllichkeit einer Anomalie geschlossen werden. Die einschlägigen zwillingspathologischen Untersuchungsergebnisse stützen sich aber nach Siemens und Praeger auf nur wenige Fälle und lassen daher noch keine Schlüsse zu.

An Stimmen, die aus dem familiären Auftreten der Zahnüberzahl ihre Vererbbarkeit folgern, fehlt es nicht. Die diesbezüglichen Ansichten von Wallisch (47) und Warnekros (50) wurden weiter oben schon erwähnt. Kantorowicz und Korkhaus (23) halten Vererbung von überzähligen Zähnen wegen des mehrfach nachgewiesenen Auftretens in mehreren Generationen für zweifellos gegeben. Die Stellungnahme Herbst's (19) ist weniger klar, wenn er sagt, daß »Über- und Unterzahl angeborene Eigentümlichkeiten sind, für welche der Keim vor der Geburt gelegt war«. Adloff (3) äußert sich folgendermaßen: Wir sehen oft in einer Familie Anomalien, des Gebisses, die verschiedene Angehörige derselben aufweisen, die also ancheinend vererbt sein müssen . . . . . Z. T., wie die überzähligen und fehlenden Zähne sind es Keimesvariationen und die Vererbung derartiger Anomalien ist daher auch nicht weiter wunderbar.« Adloff korrigiert damit offenbar seine Ansicht, die er zwei Jahre vorher folgendermaßen geäußert hatte: »Es ist streng genommen nicht statthaft, Heredität, die ja nur ein Begriff ist, direkt als Ursache einer Erscheinung anzuführen. Man darf wohl sagen, es liegt Heredität vor, aber als Ursache kommt sie kaum in Frage.«

Abweichend von diesen Stimmen, die eine Vererbung der Zahnüberzahl für gegeben erachten, kommen wir auf Grund unserer Betrachtungen zur Überzeugung, daß der derzeitige Stand der Untersuchungen noch kein abschließendes Urteil über diese Frage zuläßt. Die theoretischen Erwägungen und die wenigen Tatsachenbefunde gestatten lediglich den Schluß, daß die Zahnüberzahl aller Wahrscheinlichkeit nach auf Erbfaktoren zurückzuführen ist.

Neben der Ätiologie der überzähligen Zähne interessieren nicht minder die pathologischen Erscheinungen, die sie im Gefolge haben. Wir bezeichnen überzählige Zähne ja deswegen als Anomalien, weil sie uns bei den an sich schon beschränkten Raumverhältnissen der Kiefer als Fremdkörper erscheinen. Als solche können sie zunächst nach zwei Richtungen hin störend wirken, einmal auf die normale Dentition, dann aber auch auf die Entwicklung des Zwischenkiefers und der Oberkieferfortsätze.

Die Entstehung der überzähligen Zähne ist an keine bestimmte Zeit gebunden (Stettenheimer [44]). Es wird zwar meist angenommen, daß

sie in ihrer Entwicklung mit den Ersatzzähnen gleichen Schritt halten (Bolk [7], Wedl [51]). Bezüglich der überzähligen Emboli glaubt aber Berten (13), daß sie entsprechend ihrer rudimentären Ausbildung einen Entwicklungsvorsprung vor den bleibenden Zähnen gewinnen. In jedem Fall aber, wo die überzähligen Zähne vor oder gleichzeitig mit ihren normalen Geschwistern zur Ausbildung kommen, bedrohen sie den normalen Ablauf der Dentitionen. Berten (6) beschreibt einen Fall, wo ein Milchzahn durch mehrere in seiner Durchbruchrichtung liegende kleine Zapfenzähne verlagert und im Kiefer zurückgehalten wurde. Welche Folgen gerade das Fehlen des Milchzahnes für die Konstituierung des bleibenden Gebisses hat, ist uns bekannt. Weniger bedeutsam, aber immerhin fühlbar, wäre die Wirkung dauernder Retention oder verspäteten Durchbruchs anderer Milchzähne. Ebenso kann durch einen überzähligen Zahn Drehung und Schiefstellung normaler bleibender Zähne und damit Retention oder auch Durchbruch an falschem Ort bewirkt werden. Vielfach wird auch durch diese Verlagerung die normale Milchzahnresorption, die doch durch den Druck des nachdrängenden bleibenden Zahnes ausgelöst wird, behindert. Durch die daraus resultierende Persistenz des Milchzahnes wird die normale Einfiellung des bleibenden Gebisses gestört. Wir sehen, wie die Anomalie der Überzahl eine ganze Kette von weiteren Anomalien nach sich ziehen kann. So führen die überzähligen Zähne schließlich mittelbar zu Störungen in der Okklusion, aber auch wegen der durch die Stellungsanomalien erzeugten Retentionsstellen für Speisefeste zu umfangreicher, kaum zu verhütender Karies.

Man hat bisher geglaubt, die Lückenbildung zwischen den mittleren oberen Incisivi, das Trema, entweder auf Knochenverdichtungen, auf ein abnorm starkes und derbes Lippenbändchen oder Persistenz eines Milchzahnes zurückführen zu müssen. Für die Möglichkeit, daß ein Trema auch durch überzählige Zähne hervorgerufen werden kann, finde ich nur zwei Belege in der Literatur. Baume (zitiert nach Rosenberg [38]) und Salomon (39) berichten von je einem Fall, wo die oberen Incisivi durch eine breite von zwei überzähligen Zapfenzähnen besetzte Lücke voneinander getrennt waren. Daß bei sonst unklarer Ätiologie auch retinierte überzählige Zähne als mögliche Ursachen für das Trema in Rechnung zu ziehen sind, geht aus dem weiter unten beschriebenen Fall Hilde W. hervor. Das Röntgenbild wird hier immer nähere Aufklärung bringen.

Sind überzählige Zähne im Kiefer retiniert, dann müssen wir auch auf die möglichen Folgen, die mit der Zurückhaltung im Kiefer verbunden sein können, gefaßt sein. Als solche pathologische Erscheinungen werden angegeben: Resorption der bleibenden Zähne, die bis zur Freilegung der Pulpa führen und heftige pulpitische Schmerzen und neuralgische Erscheinungen verursachen kann, häufige Eiterungen am und in der Umgebung des

retinierten Zahnes, Cysten (Berten [6]), dumpfes Druckgefühl, unbestimmte Schmerzempfindungen, die sich bis zu ausgesprochenen Neuralgien steigern können (Partsch [30]). So veröffentlicht Jessop (22) zwei Fälle von Alveolarabzessen, die von retinierten Zähnen ausgingen. Es muß sich aber hier wohl um Halbretention gehandelt haben, da sonst die Herkunft der Eitererreger nicht erklärlich ist. Brown (10) und Field (16) stellten bei drei Patienten heftige neuralgische Schmerzen und Muskelzucken als Folge retinierter Zähne fest. Nach Berten (6) verursachen retinierte Zähne, die jahrzehntelang keine Beschwerden gemacht haben, »nicht selten beim Tragen von Prothesen an einer kleinen Stelle des Kiefers Schmerzen, Decupitis und schließlich circumscripte Eiterung«.

Auf diese pathologischen Erscheinungen und auf die Behinderung der Dentition und der normalen Einstellung der Zähne bleibt aber die Wirkung der überzähligen Zähne nicht beschränkt. Nach Warnekros (50) spielen sie als Störenfriede auch in der frühembryonalen Entwicklung der Kiefer eine wichtige Rolle. Wie schon erwähnt, hält Warnekros die überzähligen Zähne für vererbte Gebilde, »deren Anlage der Knochenanlage vorausgeht.« Treten die überzähligen Zähne im Frontbereich auf, so können sie »der vollständigen Verwachsung der weichen Primäranlagen ein Hindernis entgegenstellen.« »In der Tat habe ich mich«, sagt Warnekros weiter »oft überzeugen können, daß bei den intrauterin geheilten Hasenscharten ein überzähliger Zahn auf der betreffenden Seite sich vorfand. Ich stelle die überzähligen Zähne, die atavistisch berechtigt sind zu erscheinen, als die Hauptursache der Spaltbildungen hin.« Warnekros belegt dann seine Ansicht kasuistisch durch Aufführen einer Anzahl von Fällen und faßt schließlich seine Meinung in folgenden Sätzen nochmals zusammen: »Die keimenden Zähne, insbesondere natürlich die überzähligen Zähne, rufen in dem kleingewordenen Zwischenkiefer, in dem alle Kräfte angespannt sein müssen um die Vereinigung mit dem Oberkiefer zu erreichen, die Spaltbildungen hervor«.

Schließlich sei noch auf die pathologischen Zustände hingewiesen, wie sie die von Walkhoff und Schmitz beschriebenen Fälle von Hyperdentition darstellen. Daß unter derartigen Verhältnissen nicht nur das körperliche sondern auch das psychische Befinden der Patienten leiden muß, ist erklärlich.

Wir haben damit die verschiedenen Folgeerscheinungen überzähliger Zähne kennen gelernt und ziehen daraus die Folgerung, daß in Fällen, wo die Ätiologie einer anderen Anomalie oder eines pathologischen Zustandes unklar ist, auch mit überzähligen Zähnen als Ursache zu rechnen ist.

Im Zusammenhang mit den behandelten Fragen der Vererbung und der klinischen Bedeutung überzähliger Zähne verdient der folgende Fall nähere Beschreibung.

Bei der 6jährigen Hilde W. war die erste Dentition völlig normal

verlaufen. Das Milchgebiß zeigt aber nur teilweise normale Zahnstellung (Abbildung 1). Die zwischen den mittleren Milchincisiven und den Milchzähnen der linken Kieferhälfte sichtbaren Lücken dürfen keinesfalls als pathologisch angesehen werden, sie sind vielmehr durchaus physiologische Erscheinungen, ohne welche die Rolle des Milchgebisses als Platzhalter für das bleibende nicht durchführbar wäre. Das Fehlen dieser Zwischenräume im 4. bis 5. Lebensjahr stellt daher nach Kranz (25) ein untrügliches Prognosticum für Anomalien des Ersatzgebisses und eine ernste Mahnung zum orthodontischen Eingreifen dar. In der rechten Kieferhälfte stehen die Milchzähne miteinander in engem Kontakt und tatsächlich macht auch, wie sich heute zeigt, der bleibende J<sup>2</sup> beim Durchbruch Schwierigkeiten. (Abbildung 3)

Als nach dem Ausfall der Milchschneidezähne der Durchbruch der bleibenden mittleren Incisivi einsetzte, zeigte sich zwischen den Zähnen eine auffallende Lücke, die sich nicht, wie man hoffen konnte, mit fortschreitendem Durchbruch schloß, sondern im Gegenteil immer bedeutender wurde und schon nach vierzehn Tagen die ansehnliche Breite von 4 mm aufwies (Abbildung 2). Daß hier nur schleuniges orthodontisch-chirurgisches Eingreifen das bleibende Gebiß vor weiteren Stellungsanomalien und Dentitionsstörungen bewahren konnte, lag auf der Hand. Unklar blieb zunächst nur die Ursache dieses Tremas, die aber doch für die Wahl der therapeutischen Mittel entscheidend ist.

Äußerlich war nichts zu erkennen, was die Incisivi zu dem anormalen Durchbruch hätte veranlassen können. Persistierende Zähne der ersten Dentition, die nach Kranz (25) ein Diastema erzeugen können, waren nicht vorhanden. Angle (zitiert nach Sicher [41]) macht das anomal ausgebildete Lippenbändchen für die Lückenbildung zwischen den oberen mittleren Incisivi verantwortlich. Nach seiner Beobachtung zieht das frenulum labii sup. nämlich in vielen Fällen als derber, abnorm dicker Bindegewebsstrang über das Trema hinweg um seinen Ansatz auf der palatinalen Seite des Alveolarfortsatzes, an der papilla palatina zu nehmen. Schon durch bloße Anwesenheit dieses abnorm starken Bandes, aber auch durch seine Bewegungen, die denen der Lippe folgen, würden die durchbrechenden Incisivi zur Seite gedrängt. Daß das Lippenbändchen an der Bildung des Tremas beteiligt sein kann, ergibt sich aus der Tatsache, daß in manchen Fällen nach Excision des hypertrophischen Teils Verkleinerung der Lücke eintrat. Im vorliegenden Fall war aber das Lippenbändchen vollkommen normal ausgebildet, es kam also ätiologisch nicht in Betracht.

Die Ursache mußte demnach im Inneren des Kiefers gesucht werden. Als solche Ursachen kommen nach Herbst (20) übermäßiges, zu rasches Wachstum des Zwischenkiefers, nach Euler (14) Kantorowicz und Korkhaus (23), Kranz (25) Verdichtung der Knochenstruktur an den

Vereinigungsstellen der ossa maxillaria in Frage. Mayer (26) sieht in der mangelhaften Vereinigung der primären Oberkieferanlagen den Grund des Tremas. Sicher (41) erwähnt einen Fall, bei dem die Incisivi durch eine folliculäre Cyste zum anormalen Durchbruch und zur Tremabildung gezwungen wurden.

Das Röntgenbild zeigte keine der hier angeführten Anomalien, es ergab aber den ebenso überraschenden wie klaren Befund zweier retinierter Emboli, die teils zwischen den mittleren Ersatzschneidezähnen, teils palatinalwärts von ihnen gelagert waren. Abbildung 4 zeigt ihre Position sehr deutlich. Wir sehen auch, wie die Emboli im Kampf um Platz und Raum von den zum Durchbruch drängenden normalen Zähnen zu einer Drehung von  $180^0$  um ihre Querachse gezwungen worden sind, sodaß sie nun mit den Kronen palatinalwärts weisen. Zur Ergänzung dieses Bildes wurden vor dem operativen Eingriff Stereo-Röntgenaufnahmen angefertigt, die mit überraschender Deutlichkeit die genaue räumliche Lagerung der Emboli zur Anschauung brachten.

Die Ursache zur Retention der Emboli haben wir wohl in ihrer abnormen Lagerung im Kiefer zu suchen, welche wiederum auf die zu engen Raumverhältnisse zurückzuführen ist.

Im Juli 1927 wurden die beiden Emboli entfernt. Es erhob sich nun die Frage nach der Notwendigkeit einer orthodontischen Regulierung. In der sicheren Annahme, daß die retinierten Emboli die alleinige Ursache für das Trema abgegeben hatten, wurde auf ein orthodontisches Eingreifen verzichtet und die beiden verlagerten Incisivi wurden der Selbstregulierung überlassen. Die Schneidezähne rückten von Woche zu Woche näher aneinander und heute hat sich das Trema völlig ausgeglichen. (Abb. 3) Beide mittlere Incisivi haben sich aber ein wenig nach der rechten Kieferseite verschoben und machen so dem  $J^2$  beim Durchbruch Schwierigkeiten, sodaß unter Umständen doch noch orthodontische Maßnahmen nötig werden. Die Extraktion des Milchzahnes zur Platzbeschaffung wäre jedenfalls ein Kunstfehler.

Abgesehen aber von den Besonderheiten in pathologischer Beziehung ist der Fall auch hinsichtlich der Frage der Erbllichkeit überzähliger Zähne von Interesse. Im Oberkiefer der Mutter der Hilde W. wurde nämlich ebenfalls ein retiniertes überzähliges Zahngewebe festgestellt. (Abb. 5) Das Gebilde liegt an der Wurzelspitze des  $J^1$  und ist bis auf die Krone reformatiert. Dieser überzählige Zahn hat nie Schwierigkeiten bei der Dentition oder Schmerzen bereitet, das Gebiß weist auch keine Anomalie auf, die mit dem überzähligen Zahn in Zusammenhang gebracht werden könnte. Das hier beobachtete Auftreten der Überzahl in zwei aufeinanderfolgenden Generationen legt die Annahme nahe daß die Ausbildung überzähliger

Zähne auf eine Keimesvariation zurückzuführen ist, welche auf die Nachkommen vererbbar ist und dort wieder als dominantes Merkmal zum Ausdruck kommen kann. Die Anamnese der Mutter weiß nichts von einem sonstigen familiären Auftreten der Überzahl zu berichten, die ascendenten Verwandten der Mutter standen mir zur Untersuchung auch nicht zur Verfügung. Aber selbst wenn alle verfügbaren Glieder der mütterlichen Blutsverwandtschaft die Anomalie nicht aufweisen würden, wäre damit noch kein Gegenbeweis gegen die Erbllichkeit der überzähligen Zähne geliefert, da ererbte Charaktere, wie wir wissen, nicht unbedingt in Erscheinung treten brauchen. Sie können vielmehr recessives Verhalten zeigen, wobei sie dennoch, wenn auch latent, vorhanden sind.

Die beiden Emboli, die aus dem Oberkiefer der Hilde W. entfernt wurden, haben eine Länge von ca 11 mm und in der Gegend des Schmelzwulstes der Krone einen größten Durchmesser von 5 mm. Die Wurzel übertrifft die Krone kaum an Länge. Wurzel und Krone weisen die Gestalt eines gedrungenen Kegels auf. Der eine Embolus zeigt an der Wurzelspitze einen Defekt, der sich auf Dentin und Cement erstreckt und an seinen scharfen Rändern und glatten Flächen zweifelsfrei als Fraktur erkenntlich ist. Als Folge einer Resorption ist er nicht aufzufassen, da die typischen Resorptionslakunen fehlen. (Abb. 10 u. 11). Resorptionsstellen waren an den Emboli überhaupt nicht auffindbar.

Nach dem axialen Längsschliff, der von dem einen Embolus angefertigt wurde, ergab sich eine Dicke der Schmelzhaube von 0,7–1 mm, eine größte Dicke des Dentins von 1,5 mm. Das Cement umschließt die Wurzel in einer gleichmäßig dünnen Schicht. Das Pulpencavum gibt, wie bei normalen Zähnen, die Form von Krone und Wurzel wieder. Unter dem Mikroskop zeigt der Schliff vollkommen normale Struktur des Schmelzes und des Dentins, Spuren von Verkalkungsstörungen und Anzeichen von Hypoplasien sind nirgends festzustellen. (Abb. 6.)

Der zweite Embolus wurde entkalkt. Der mikroskopische Befund der gefärbten Schnitte bestätigt den durchaus normalen Bau des Dentins. (Abb. 7–11). Dagegen zeigt die Pulpa erhebliche Abweichungen vom normalen histologischen Bild. Wir sehen das Bindegewebe nicht wie gewöhnlich in gleichmäßiger Verteilung die Pulpa durchziehen, sondern zu einem weitmaschigen Netzwerk auseinandergezogen. Die Fäden dieses Netzes werden durch festaneinandergedrückte Bindegewebsfibrillen gebildet, deren Zellen nur in geringer Zahl zu sehen sind. Die Zwischenräume des Netzwerkes stellen weite Vacuolen dar. Auch die Odontoblasten sind zum größten Teil zugrunde gegangen, an ihre Stelle sind bläsig aufgetriebene Lumina getreten. Die Blutgefäße erscheinen stark erweitert. (Abb. 7–10). Diese Befunde führen zur Diagnose: totale Atrophie der Pulpa.

Auf die Frage nach den Ursachen dieser Atrophie geben uns die Untersuchungen verschiedener Autoren Antwort: Römer (37) spricht von primärer oder seniler Atrophie der Pulpa, wenn entweder die Lebensenergie der Pulpenzellen so stark abgenommen hat, daß diese das dargebotene Nährmaterial nicht mehr in genügendem Maße aufnehmen können, oder, wenn die Ernährung der Zellen durch ungenügende Blutzufuhr gefährdet ist. Römer weist dabei darauf hin, daß solchen Störungen auch bei jugendlichen Zähnen vorkommen können. Auch bei unseren Emboli wird eine solche Ab schnürung der Blutzufuhr durch ihre Verlagerung und Drehung verständlich gemacht. Euler (14) nimmt bei retinierten Zähnen eine Art Inaktivitätsatrophie der Pulpa an. Braßch (9) kommt auf Grund eingehender histologischer Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß die Pulpenatrophie nicht der Ausdruck einer schädlichen Einwirkung zu sein braucht, daß vielmehr die Pulpa eine rein physiologische Hinfälligkeit besitzt, die allein oder zusammen mit der Inaktivität zur Atrophie führen kann. Die sekundäre, als Folge einer Pulpaentzündung auftretende Atrophie des Pulpengewebes kommt im vorliegenden Falle nicht in Betracht, da die Anamnese keinerlei Anhaltspunkte für eine überstandene Pulpenerkrankung gibt.

Überblicken wir die vorstehenden Betrachtungen, so kommen wir zu folgender Zusammenfassung unserer Ausführungen:

Da Störungen im normalen Aufbau des Organismus offenbar ebenso auf die embryonale wie auf die Stammesgeschichtliche Entwicklung und damit auch auf Vererbung zurückzuführen sind, müssen bei der ätiologischen Betrachtung der Anomalien in gleicher Weise die Ergebnisse der Ontogenie, der Phylogenie und der Vererbungsforschung herangezogen werden.

Die Entwicklungsgeschichte ist nicht imstande die ersten Ursachen der Zahnüberzahl aufzuklären, denn die exogenen Faktoren, welche auf die embryonale Entwicklung eines Organs Einfluß gewinnen können, sind wohl imstande Mißbildungen oder völlige Unterdrückung herbeizuführen. Neues aber vermögen sie nicht zu schaffen. Die überzähligen Zähne stellen in den allerwenigsten Fällen Mißbildungen dar, sie sind vielmehr Zahnindividuen von typischer, wenn auch primitiver Gestalt (Zapfen- und Höckerzähne) und durchaus normaler Gewebsstruktur (Abb. 6—10). Ein so geordneter Aufbau neuer Organe ist nur möglich, wenn die Grundlagen dafür im Keimplasma vorhanden waren.

In derselben Erkenntnis haben viele Autoren die menschliche Stammesgeschichte zu Rate gezogen. Besonders bemerkenswert erscheint die Art, wie Orth (29) die Stammesgeschichte als ätiologischen Faktor für Anomalien in die Entwicklungsgeschichte einführt. Da die Ontogenie die Rekapitulation der Phylogenie ist, können manche tierähnliche Bildungen als Hemmungsbildungen, als »ontogenetische Atavismen« angesehen

werden. Diese Auffassung hat viel für sich und kann auch auf die Zahnüberzahl angewandt werden. Es fragt sich nur, ob die angenommenen »Hemmungen« idiotypischer oder paratypischer Natur sind. Die Annahme, daß sie bereits im Keimplasma begründet sind, liegt näher.

Vielfach werden die überzähligen Zähne auch als reine phylogenetische Atavismen angesehen, d. h. als plötzliches Wiederauftreten von Artmerkmalen, die Generationen hindurch nicht mehr in äußere Erscheinung getreten waren. Atavismus ist demnach nichts anderes als Vererbung, die nach den Mendel'schen Regeln von der Recessivität und Dominanz eines Artmerkmals vor sich geht. Geben wir aber die Möglichkeit eines atavistischen Rückschlags zu, dann muß es gestattet sein, auch das homodonte, polyphyodonte Gebiß niederer Wirbeltiere zum Vergleich heranzuziehen. Der Versuch, den Vergleichstypus auf die Zahnformel des Säugetiergebisses zu beschränken, steht mit den Lehren der Descendenz und der Vererbungsforschung in Widerspruch.

Da Atavismus eine Ausdrucksform der Vererbung ist, müssen atavistisch auftretende Merkmale ihrerseits wieder vererbbar sein. Von mancher Seite wird die Vererbung überzähliger Zähne wegen des hie und da beobachteten familiären Auftretens dieser Anomalie unumwunden zugegeben. Ein neuerdings in der zahnärztlichen Klinik beobachteter Fall, wo Mutter und Tochter überzählige Zähne aufwiesen, verdiente in diesem Zusammenhang nähere Würdigung. Die Statistik der familiären Hyperdentition hat bisher noch zu wenig Material gesammelt, als daß daraus ein zwingender Schluß auf Erbllichkeit der Zahnüberzahl gezogen werden könnte.

Aus alledem ergibt sich die hohe Wahrscheinlichkeit, daß die Zahnüberzahl auf Erbfaktoren zurückzuführen ist. Der wissenschaftliche Beweis dafür ist allerdings noch zu erbringen.

Die klinischen Folgen der überzähligen Zähne können sowohl das Milch- wie das bleibende Gebiß betreffen. Meist äußern sie sich in einer ganzen Reihe von Anomalien, die miteinander ursächlich zusammenhängen und in ihrem Ursprung auf den überzähligen Zahn zurückgehen. Bleibt der überzählige Zahn retiniert, was bei den beschränkten Raumverhältnissen häufig geschieht, dann kann er alle Folgeerscheinungen, die bei Zahnretentionen möglich sind, auslösen. Von besonderem Interesse ist die Ansicht Warnekros's, der die überzähligen Zähne für die Ursache der Gaumen- und Kieferspalten anspricht. Daß retinierte überzählige Zähne auch zum Trema führen können, zeigt der näher beschriebene Fall Hilde W.

## Literatur = Verzeichnis:

- 1) Adloff: »Überzählige Zähne und ihre Bedeutung.« D. Mon. Schr. f. Z. 1901 S. 219.
- 2) „ : »Zur Frage nach der Beurteilung von überzähligen Zähnen.« D. Mon. Schr. f. Z. 1901 S. 419.
- 3) „ : »Über Formveränderungen von Zähnen infolge mechanischer Einflüsse.« D. Mon. Schr. f. Z. 1907.
- 4) „ : »Über Zahnretention.« Zahnärztl. Woch. Schr. 1910.
- 5) Baume: Lehrbuch der Zahnheilkunde. 3. Auflage.
- 6) Berten: »Über Zahnretention.« Korresp. Bl. f. Z. 1910.
- 7) Bolk: »Die überzähligen oberen Incisivi des Menschen.« D. Mon. Schr. f. Z. 1917.
- 8) Busch: »Über- und Unterzahl in d. Zähnen d. Menschen.« D. M. f. Z. 1886/87.
- 9) Brasch: »Über die Atrophie der Pulpa der bleibenden Zähne.« D. Mon. Schr. f. Z. 1912.
- 10) Brown: »Ein Fall von verspätetem Durchbruch.« D. Mon. Schr. f. Z. 1901.
- 11) Brunsmann: »Überzählige Zähne und ihre Bedeutung.« D. Mon. Schr. f. Z. 1901.
- 12) Dependorf: »Zur Frage der überzähligen Zähne im menschlichen Gebiß.« Zeitschr. f. Morphol. u. Anthropol. 1907.
- 13) Erdmann: »Beiträge zur Frage der Zapfenzähne.« Inaug. Dissert. München 1923.
- 14) Euler: »Lehrbuch der Zahnheilkunde.« München 1920.
- 15) Fox: »Ein seltsamer Fall von Zahndurchbruch.« D. Mon. Schr. f. Z. 1901.
- 16) Field: D. Mon. Schr. f. Z. 1898 S. 360 (Ref.)
- 17) Greve: »Überzahl und Zwillingsbildung.« Korresp. Bl. f. Z. 1905.
- 18) Herbst: »Die Gewebsmißbildungen als formale Genele der Tumoren, gleichzeitig ein Versuch für eine neue Theorie für die Genele der Emboli.« D. Mon. Schr. f. Z. 1924.
- 19) Herbst: »Über die Vererbungsstheorie der Stellungsanomalien. D. Mon. Schr. f. Z. 1911.
- 20) Herbst: »Zahnärztliche Orthopädie.« München 1922.
- 21) Haecker: »Allgemeine Vererbungslehre.« Braunschweig 1912.
- 22) Jeffop: D. Mon. Schr. f. Z. 1898 (Auszug).
- 23) Kantorowicz u. Korkhaus: »Ätiologie der orthodontischen Anomalien.« In Mißch, »Fortschritte d. Zahnheilkunde« II. Bd.
- 24) Kollmann: »Entwicklung der Milch- und Ersatzzähne des Menschen.« Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. XX.
- 25) Kranz: »Einführung in die Orthodontie.« Berlin 1927.
- 26) Mayer: »Zusammentreffen von Bildungsanomalien der Mundhöhle mit körperlicher Minderwertigkeit.« D. Mon. Schr. f. Z. 1911.
- 27) v. Metnitz: »Überzählige Schneidezähne.« Öst. Ung. Vierteljahr. Schr. f. Z. 1888.
- 28) Öhrlein: »Entwicklungsgeschichte und Histogenele.« In Mißch, »Fortschritte d. Zahnheilk.« 1925.
- 29) Orth: »Angeborene und ererbte Krankheiten und Krankheitsanlagen.« In Senator »Krankheit und Ehe« München 1904.
- 30) Partsch: Handbuch der Zahnheilkunde.« Bd. I. München 1924.

- 31) Peckert: »Die Mißbildungen des Gebisses.« In Schwalbes »Morphologie der Mißbildungen des Menschen und der Tiere.« Jena 1911.
- 32) Peckert: »Ein Beitrag zur Kaluistik ungewöhnlicher Hyperdentitionen.« D. Mon. Schr. f. Z. 1907.
- 33) Praeger: »Vererbungspathologie des menschlichen Gebisses.« Zahnärztl. Rundschau 1924.
- 34) Respinger: »Ein Beitrag zum Kapitel der supernumerären Zähne.« Schw. Viertelj. Schr. f. Z. 1898.
- 35) Riesenfeld: »Die dentes emboliformes.« D. Mon. Schr. f. Z. 1909.
- 36) Riha: »Über eine zapfenartige Umformung des Tuberculum denta'e.« D. Mon. Schr. f. Z. 1911.
- 37) Römer: »Atlas der pathol. u. anatom. Veränderungen der Zahnpulpa.« Freiburg 1909.
- 38) Rosenberg: »Über Umformungen an den Incisivi der II. Zahngeneration.« Morphol. Jahrbuch 1895.
- 39) Salomon: Zahnärztl. Rundschau 1924 S. 607.
- 40) Schmitz: D. Mon. Schr. f. Z. 1901 S. 126.
- 41) Sicher: »Zur Kenntnis des Tremas im Oberkiefer.« Öst. Ung. Viertelj. Schr. f. Z. 1914.
- 42) Siemens: »Die Zwillingspathologie, ihre Bedeutung, ihre Methodik, ihre bisherigen Ergebnisse.« Berlin 1924.
- 43) Stehr: »Beitrag zur Ätiologie der Deformation und Degeneration des menschlichen Gebisses.« Schw. Viertelj. Schr. f. Z. 1904.
- 44) Stettenheimer: »Beitrag zur Frage der überzähligen Zähne.« D. Mon. Schr. f. Z. 1910.
- 45) de Terra: »Vergleichende Anatomie des menschlichen Gebisses und der Zähne der Vertebraten.« Jena 1911.
- 46) Urbantschitsch: »Supernumeräre Zähne.« Öst. Ung. Viertelj. Schr. f. Z. 1908.
- 47) Wallisch: »Überzählige Zähne und ihre Beziehung zur atavistischen Theorie.« D. Mon. Schr. f. Z. 1897.
- 48) Walkhoff: »Über den Bau und die Entstehung einiger Zahnmißbildungen.« D. Mon. Schr. f. Z. 1896.
- 49) Walkhoff: D. Mon. Schr. f. Z. 1911 (Verf. Bericht)
- 50) Warnekros: »Die Entstehung der Hafenscharten, des Wolfraehens und der hinteren Gaumenspalten.« Korresp. Bl. f. Z. 1899.
- 51) Wedl: Pathologie der Zähne, 1901.
- 52) Weismann: »Die Kontinuität des Keimplasmas als Grundlage einer Theorie der Vererbung. Jena 1885.
- 53) Weismann: »Amphimixis oder die Vermischung der Individuen.« Jena 1891.

Außerdem waren folgende Arbeiten einschlägig:

- Adloff: »Vererbung u. Auslese im Zahnsystem des Menschen.« D. Mon. Schr. f. Z. 1911.
- Aichel: »Das Problem d. Entstehung d. Zahnform.« Arch. f. Anat. u. Physiol. 1915.
- Albrecht: »Über sechssehneidezähniqe Gebisse beim normalen Menschen.« Cent. Bl. f. Chir. 1885.
- Amadei: »Anomalien d. Zähne u. die sie begleitenden Schädelanomalien. Virchow Archiv 1883.
- Astrachoff: »Konstitutionelle Fragen in d. odontologischen Klinik.« D. Mon. Schr. f. Z. 1926.

- Bauer: »Zur Frage der Retention.« *Ergebn. d. gef. Zahnheilk.* 1913, Heft 5.
- Berten: »Hypoplasien des Schmelzes.« Leipzig 1895.
- Bordardt: »Über die Reduktion der kleinen Schneidezähne d. Oberkiefers. Ein Beitrag z. Vererbungslehre u. Orthopädie. *Zeitschr. für zahnärztl. Orthopädie* 1922.
- Bulch: »Zwei Fälle, in denen Gaumenspalten neben überz. Zapfenzähnen verlaufen.« *D. M. Schr. f. Z.* 1887.
- Favé: »Überzählige Zähne.« *Schw. V. f. Z.* 1922.
- Friedeberg-Schwarz: »Ein Beitrag zur Kallistik der Zahnanomalien.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1922.
- Fuchs: »Entwicklungsgeschichte d. Zahnformen.« *D. Mon. f. Z.* 1914.
- Guyer: »Abnormitäten d. Kiefer u. Zähne vom Standpunkt d. Vererbung.« *Zeitschr. f. zahnärztl. Orth.* 1926.
- Haedekel: »Natürliche Schöpfungsgeschichte.« Berlin 1909.
- Herber: »Die Lehre von der Vererbung in ihrer letzten Konsequenz auf Kiefer und Zähne d. Menschen.« Leipzig 1910.
- Herbst: »Die Bedeutung des Kampfes ums Dasein f. d. Beurteilung der Ätiologie der Kieferanomalien.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1924.
- Herbst: »Die Bedeutung d. Zwischenkiefers f. d. Mißbildung, des menschl. Gebisses.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1923.
- Hilzenhauser: »Erbliche Kiefermißbildung u. Zahnverspätung.« *Österr. Ung. V. f. Z.* 1904.
- Jouy: »Über die ursächlichen Beziehungen der bel. häufig auftretenden Kiefer- u. Zahnanomalien zur Idiotie u. Imbecillität.« *Inaug. Diss. München* 1922.
- Kantorowicz: »Die Bedeutung d. Vererb. Probleme f. die Zahnheilk.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1912.
- Kantorowicz: »Die Progenie u. ihre Vererbung.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1915.
- Kerfing: »III. Dentition«, *Österr. Ung. V. f. Z.* 1904.
- Knoche: »Die Degeneration des Gebisses.« *Zahnärztl. Rundschau* 1924.
- Koch: »Vererblich. retinierter Zähne.« *Inaug. Diss. Breslau* 1923.
- Kranz: »Innere Sekretion in Bez. z. Kieferbildung u. Zahnentwicklung.« *Deutsche Zahnheilk. in Vorträgen* Heft 32.
- Lajard: »Trophische Störungen der Haare, Nägel u. Zähne auf hereditärer Grundlage.« *Zentralbl. f. Path.* 1893, Heft 13.
- Loos: »Aus der Biologie.« *Ergebn. d. gef. Zahnheilk.* 1911, Heft I.
- Lubowski: »Die chirurg. orthod. Behandlung d. Diastema.« *Zeitschr. f. zahnärztl. Orthop.* 1910.
- Luniatzheck: »Ursachen u. Formen. d. Zahnretentio.« *D. Mon. f. Z.* 1906.
- Marshhausen: »Ein eigentümlicher Fall von überz. Zähnen.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1902.
- Mayerhoff: »Überz. Zähne im Gebiet d. oberen Schneidezähne.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1911.
- Pfaff: »Die Abnormitäten d. Kiefer u. Zähne u. ihre Behandlung.« *Ergebn. d. gef. Zahnh.* 1911, Heft I.
- Pohlmann: »Mißbildungen, im Bel. Gesichtsmißbildungen im histor. u. embryol. Bilde«, *D. M. Schr. f. Z.* 1911.
- Preiswerk-Maggi: »Die Rolle d. Zwischenkiefers bei Bildung von Zahn- u. Kieferanomalien.« *D. Mon. Schr. f. Z.* 1908.
- Mc. Quillen: »Erbfehler u. ererbte Unregelmäßigkeiten d. Zähne.« *D. Viertelj. Schr. f. Z.* 1871.

- Riepenhausen: »Odont. Zwillingsuntersuchungen.« Inaug. Diff. München 1925.
- Sachse: »Überzählige Zähne bei d. Kieferspalte.« Centralbl. f. Chir. 1890.
- Scherbel: »Das Diastema u. seine Behandlung.« Z. f. Stom. 1921.
- Siemens: »Einführung in die allg. Konstit. u. Vererb.-Pathologie.« Berlin 1921.
- Siemens u. Hunold: »Zwillingspathol. Untersuchungen d. Mundhöhle.« Archiv f. Dermat. u. Syphilis 1924.
- Steiner: »Kasuistik u. Bemerkungen zur Vererbung von Zahn- u. Kieferanomalien.« Zeitschr. f. Stomat. 1927.
- Türkheim: »Symmetrische Anomalien im Zahnfyllem.« D. Mon. Schr. f. Z. 1927.
- Vobis: »Selbstaushheilung einer Stellungsanomalie.« (Diastema.) Z. f. zahnärztl. Orth. 1926.
- Walkhoff: »Die Bedeutung der Vererbungsprobleme f. die Zahnheilkunde.« D. Mon. Schr. f. Z. 1912.
- Walkhoff: »Der Einfluß der Vererbung u. die funktionelle Selbstgestaltung bei einzelnen Stellungsanomalien der Zähne.« D. Mon. f. Z. 1910.
- Weiß: »Vererbung von Zahnmißbildungen.« Korresp. Bl. f. Z. 1890.
- Weitz: »Über die Bedeutung d. Erbmasse f. d. Gebiß.« Zeitschr. f. zahnärztl. Orth. 1924.
- Werner: »Über die Zapfenzähne d. Menschen.« Inaug. Diff. München 1892.
- Zeiger: »Das Problem d. Vererbung im Zahn- u. Kieferapparat.« Zeitschr. f. zahnärztl. Orth. 1926.
- Zuckerlandl: »Über rudimentäre Zähne.« Mediz. Jahrbuch 1885.

### Lebenslauf.

Geboren am 22. September 1891 zu Germersheim, absolvierte ich 1910 das Gymnasium in Ingolstadt und trat im selben Jahre in den Heeresdienst um die Offizierslaufbahn zu ergreifen. Nach 4 jähriger Frontdiensttätigkeit wurde ich in das neue Reichsheer übernommen, aus dem ich nach Beförderung zum Hauptmann auf meinen eigenen Wunsch hin abschied. Nach 2 jähriger kaufmännischer Tätigkeit im Bankfache entschloß ich mich zum Studium der Zahnheilkunde, dem ich mich 6 Semester an der Universität München, 1 Semester an der Universität Freiburg i. B. widmete. Als durch Kriegsdienstzeit verfäumt wurde mir 1 Semester an der Studienzeit erlassen. Die Approbation erwarb ich im Mai 1928 in München.




Abb. 1.  
Obere Milchzahnreihe.



Abb. 2.  
Bleibende mittl. Incisivi u. linker Incisivus  
im Durchbruch. Breites Trema.



Abb. 3.  
Nach Entfernung d. ret. Emboli.  
Die 1J1 sind zusammengerückt, erscheinen  
aber beide etwas nach rechts verschoben.  
Durchbruch des J<sup>2</sup> verspätet.




Abb. 4.  
Röntgenbild der ret. überz. Emboli der  
Hilde W



Abb. 5.  
Röntgenbild d. retinierten Embolus der  
Mutter




Abb. 6.




Abb. 7.




Abb. 8.




Abb. 9.




Abb. 10.




Abb. 11.



